

## Uwaga - Metanol Zabija!

Wpisany przez Administrator  
piątek, 15 listopada 2013 10:26 - Poprawiony piątek, 15 listopada 2013 10:54

---

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Sanitarny **ostrzega przed spożywaniem** alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi.





**Główny Inspektor Sanitarny**



**Państwowa Agencja  
Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych**

## **OSTRZEGAJĄ**

przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml ( $\frac{1}{2}$  kieliszka do wódki) **alkoholu metylowego** uszkadza nerw wzrokowy  
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) **alkoholu metylowego** to dawka śmiertelna

### **Gdzie najczęściej występuje metanol:**

- w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
- w płynach do spryskiwaczy
- w denaturacie
- w odmrażaczach do szyb
- w rozpuszczalnikach

### **Objawy zatrucia alkoholem metylowym:**

- pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)
- następnie pojawiają się:
  - ⇒ bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
  - ⇒ silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
  - ⇒ senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)

### **Pierwsza pomoc:**

- wezwać pogotowie ratunkowe
- jeśli zatruty jest przytomny:
  - ⇒ wywołać u niego wymioty
  - ⇒ podać do picia  $\frac{1}{2}$  szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
  - ⇒ jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w  $\frac{1}{2}$  szklanki wody

## **Uwaga - Metanol Zabija!**

Wpisany przez Administrator  
piątek, 15 listopada 2013 10:26 - Poprawiony piątek, 15 listopada 2013 10:54

---